INFORMACJA DLA PACJENTA

Zalecenia po zabiegu VenaSeal

Najważniejsze informacje dotyczące aktywności, gojenia i objawów wymagających kontaktu po zamknięciu żyły klejem medycznym.

Po zabiegu VenaSeal

VenaSeal zamyka niewydolną żyłę za pomocą niewielkiej ilości kleju medycznego. Zabieg jest nietermiczny i nie wymaga znieczulenia tumescencyjnego wzdłuż całej leczonej żyły. Po zamknięciu żyły krew odpływa innymi, prawidłowo funkcjonującymi naczyniami.

> Po VenaSeal rutynowa kompresjoterapia nie zawsze jest konieczna. U części pacjentów lekarz może jednak zalecić pończochę uciskową ze względu na zakres choroby, dodatkowe żylaki, obrzęk lub inne indywidualne czynniki.

W dniu zabiegu i w kolejnych dniach

- chodź normalnie i unikaj długiego pozostawania bez ruchu,
- miejsce wkłucia utrzymuj czyste i suche zgodnie z otrzymanym zaleceniem,
- codzienną aktywność można zwykle podejmować szybko, jeśli samopoczucie na to pozwala,
- intensywny trening, długie biegi i duże obciążenia wznawiaj stopniowo, zgodnie z zaleceniem lekarza,
- nie zmieniaj samodzielnie leczenia przeciwkrzepliwego ani innych leków przewlekłych.

Co może się pojawić?

Objawy zwykle łagodne i przemijające

- niewielka tkliwość w miejscu wkłucia,
- uczucie ciągnięcia w przebiegu zamkniętej żyły,
- miejscowe zaczerwienienie lub stwardnienie,
- niewielki siniak lub podrażnienie skóry.

Wymagają kontaktu z lekarzem

- narastające, rozległe zaczerwienienie i ból,
- duży obrzęk kończyny,
- wysypka, świąd lub inne objawy reakcji nadwrażliwości,
- gorączka lub objawy zakażenia w miejscu wkłucia.

Reakcja zapalna po kleju

U części pacjentów może pojawić się miejscowa reakcja zapalna wzdłuż leczonej żyły: zaczerwienienie, tkliwość, uczucie napięcia lub świąd. Najczęściej ma przebieg łagodny, ale jej charakter powinien być oceniony przez lekarza, zwłaszcza gdy objawy są nasilone lub narastają.

Kiedy potrzebna jest pilna pomoc?

> Natychmiast zgłoś się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi nagły znaczny obrzęk kończyny, silny ból łydki, duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, omdlenie lub ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, języka albo trudnością w oddychaniu.

Kontrola po zabiegu

Kontrola służy ocenie miejsca wkłucia, przebiegu gojenia oraz - w zależności od sytuacji klinicznej - potwierdzeniu zamknięcia leczonej żyły w badaniu USG Duplex Doppler. Termin kontroli ustalany jest indywidualnie.

Pamiętaj

- VenaSeal zamyka niewydolną żyłę, ale nie usuwa automatycznie wszystkich widocznych żylaków i pajączków,
- w części przypadków plan leczenia obejmuje później skleroterapię lub inne leczenie uzupełniające,
- ustąpienie dolegliwości i przebudowa zamkniętej żyły wymagają czasu.

Ważne: Materiał ma charakter edukacyjny. Zalecenia przekazane przez lekarza po konkretnym zabiegu lub konsultacji mają pierwszeństwo przed informacjami ogólnymi.
Źródła: ESVS Clinical Practice Guidelines on Chronic Venous Disease (2022); oficjalne informacje dotyczące systemu VenaSeal firmy Medtronic, dostęp 2026.